

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: Директор филиала

Дата подписания: 03.11.2023 07:12:01

Уникальный программный ключ:

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

23947d8ec706a9c114b6d34ab06

Кафедра Информационных технологий, электроэнергетики и систем управления



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению расчетно-графических работ №1
по дисциплине
«Физика»**

Направление
подготовки

**09.03.02 – Информационные системы и
технологии**

(код и наименование направления
подготовки)

Направленность
подготовки

**Информационные технологии в
медиаиндустрии и дизайне**

(наименование профиля подготовки)

Квалификация
выпускника

Бакалавр

Форма обучения

очная и заочная

Чебоксары, 2022

Методические указания разработаны в соответствии с:

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 – Информационные системы и технологии, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 926 от 19 сентября 2017 г.

зарегистрированный в Минюсте 12 октября 2017 года, рег. номер 48535 (далее – ФГОС ВО).

- учебным планом (очной, заочной форм обучения) по специальности 09.03.02 – Информационные системы и технологии.

Автор: Лепаев Александр Николаевич, доцент кафедры ИТЭСУ
(указать ФИО, учennую степень, ученое звание или должностноть)

Методические рекомендации одобрены на заседании кафедры
Информационных технологий, электроэнергетики и систем управления

(протокол № 10 от 14.05.2022 г.).

1. Цель расчетно-графической работы - выявить знания студентов основ физики, производить расчеты, привить обучающимся навыки самостоятельной работы с применением математических методов.

В ходе выполнения расчетно-графической работы обучающийся должен проявить умение самостоятельно работать с учебной литературой, применять теоретические знания для решения задач и анализа конкретных данных.

Расчетно-графическая работа должна быть выполнена и представлена в срок, установленный графиком учебного процесса.

Выполнение расчетно-графической работы включает следующие этапы:

- ознакомление с программой дисциплины «Физика», методическими рекомендациями по выполнению расчетно-графической работы; проработка соответствующих разделов физики: «МЕХАНИКА», «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА» по рекомендованной учебной литературе, конспектам лекций;
- выполнение расчетов с применением освоенных методов.

Завершенная работа представляется для проверки на кафедру преподавателю в установленные учебным графиком сроки. Срок проверки не более 5-7 дней. Преподаватель проверяет качество работы, отмечает положительные стороны, недостатки работы и оценивает ее. Обучающиеся, не подготовившие расчетно-графическую работу, к зачету и экзамену не допускаются.

2. Выбор варианта и структура расчетно-графической работы

Задания для расчетно-графических работ составляются преподавателем, который ведет данную дисциплину, и утверждаются кафедрой.

Номер варианта расчетно-графической работы выбирается обучающимся по последней цифре в шифре номера зачетной книжки. Так, например, если последняя цифра шифра 1, то обучающийся выполняет расчетно-графическую работу по варианту № 1.

По этому номеру и по таблице вариантов (таблица 1) находятся задачи, которые должен решить студент.

Таблица 1

Задачи	Вариант										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
2	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	

3	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
4	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
5	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
6	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
7	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
8	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270

Задания выполняются в течение 1-го семестра.

При выполнении расчетно-графической работы необходимо придерживаться следующей структуры:

- титульный лист;
- введение;
- расчетная часть;
- заключение;
- список использованной литературы.

Титульный лист является первой страницей расчетно-графической работы. Образец его оформления приведен в Приложении.

Во введении содержатся общие сведения о выполненной работе (0,5-1 с).

В расчетной части обучающийся должен показать умение применять математические методы расчетов, рассчитывать необходимые данные, делать на их основе аргументированные выводы.

Условия задач в расчетной части должны быть приведены полностью. Решение задач следует сопровождать развернутыми расчетами, ссылками на математические формулы, анализом и выводами. Задачи, в которых даны только ответы без промежуточных вычислений, считаются нерешенными.

Следует обратить особое внимание на выводы, которые должны быть обоснованными, подтверждаться предварительным анализом цифрового материала.

В заключении расчетно-графической работы (1 с.) в краткой форме резюмируются результаты работы.

После заключения приводится список литературы, включающий только те источники, которые были использованы при выполнении расчетно-графической работы и на которые имеются ссылки в тексте работы.

При описании литературных источников необходимо указать:

- фамилии и инициалы авторов;
- название книги, сборника, статьи;
- место издания;
- издательство;

- год издания;
- количество страниц или конкретные страницы (последние в случае ссылки на статью или статистический сборник).

Стандартный формат описания источников приведен в списке литературы.

3. Требования к оформлению расчетно-графической работы

При оформлении расчетно-графической работы необходимо руководствоваться следующими требованиями:

1. Объем работы - 5-10 страниц текста на стандартных листах формата А4, набранных на компьютере с использованием текстового редактора или вручную (письменно), табличного процессора или других программных средств (размер шрифта - 14 пунктов, интервал - 1,5).

2. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля слева и справа не менее 25 мм для замечаний преподавателя-консультанта.

3. В тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых.

4. Все промежуточные данные проводимых расчетов и результаты следует представлять в явном виде.

5. Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Приведенные в работе иллюстрации (графики, диаграммы) должны иметь подрисуночные надписи.

6. Описание литературных источников выполняется в соответствии со стандартными требованиями, приведенными в предыдущем разделе.

4. Задания и методические указания для выполнения расчетно-графической работы студентами очной формы обучения

Механика

Понятие состояния в классической механике. Уравнения движения: Модели в механике. Система отсчета. Траектория, путь, перемещение. Скорость, ускорение. Угловая скорость, угловое ускорение. Связь угловых и линейных характеристик движения. Тангенциальное, нормальное и полное ускорения.

Динамика материальной точки: Первый закон Ньютона. Масса.

Сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Силы трения

Законы сохранения: Импульс. Закон сохранения импульса. Центр масс. Энергия. Элементарная работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон сохранения механической энергии и превращения энергии. Абсолютно упругий и неупругий удары тел.

Кинематика и динамика твердого тела: Момент инерции.

Кинетическая энергия вращения. Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. Деформации твердого тела. Напряжение. Абсолютная и относительная деформации. Закон Гука. Диаграмма растяжения.

Тяготение. Элементы теории поля: Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Сила тяжести. Вес. Невесомость. Поле тяготения и его силовая и энергетическая характеристики. Работа в поле тяготения. Космические скорости. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.

Механика жидкостей: Давление. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и следствия из него. Вязкость. Режимы течения жидкостей. Движение тел в жидкостях и газах.

Основы релятивистской механики: Преобразования Галилея. Механический принцип относительности. Постулаты СТО. Преобразования Лоренца и следствия из них. Интервал между событиями. Основной закон релятивистской динамики материальной точки. Взаимосвязь массы и энергии.

Механические колебания: Гармонические колебания и его характеристики. Физический и математический маятники. Сложение гармонических колебаний одного направления. Биения. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний. Логарифмический декремент затухания. Добротность. Автоколебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Резонанс.

Упругие волны: Продольные и поперечные волны. Волновое уравнение. Фазовая и групповая скорости. Интерференция волн. Стоячие волны. Звуковые волны. Эффект Доплера в акустике.

Молекулярная физика и термодинамика

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) газов, статистическая физика: Статистический и термодинамический методы исследования. Опытные законы идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ идеальных газов. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.

Элементы неравновесной термодинамики: Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. Опытное обоснование МКТ (Броуновское движение, опыт Штерна). Теплопроводность. Диффузия. Внутреннее трение (вязкость).

Первое начало термодинамики: Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения по степеням свободы молекул. Внутренняя энергия. Первое начало термодинамики. Работа

газа при изменении объема. Энталпия. Теплоемкость. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатический и политропный процессы.

Второе и третье начала термодинамики: Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. Энтропия системы, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью. Равенство неравенство Клаузиуса. Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики (уравнение Нернста-Планка). Тепловые двигатели, холодильные машины. Цикл Карно и его КПД.

Реальные газы и жидкости: Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Уравнение и изотермы Ван-Дер-Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Свободная энергия. Смачивание. Давление под искривленной поверхностью жидкости. Капиллярные явления.

Твердые тела: Твердые тела. Моно- и поликристаллы. Типы кристаллических твердых тел. Дефекты в кристаллах. Испарение, сублимация, плавление и кристаллизация. Аморфные тела. Фазовые переходы первого и второго рода. Диаграмма состояния. Тройная точка.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Номера задач, которые студент должен включить в свою контрольную работу, определяются по таблицам вариантов.

2. Контрольные работы надо выполнять в школьной тетради, на обложке которой привести следующие сведения: номер контрольной работы, наименование дисциплины, специальность, курс и форму обучения, учебный шифр, фамилия и инициалы студента, а также фамилия ведущего преподавателя.

3. Условия задач в контрольной работе надо переписать полностью без сокращений. Каждую задачу необходимо начинать с новой страницы.

4. В конце контрольной работы следует указать учебники или учебные пособия, которые использовались студентом при решении задач.

5. Контрольную работу на проверку следует сдать в деканаты своих факультетов до начала экзаменационной сессии.

6. Если контрольная работа при проверке не зачтена, студент обязан исправить неверные решения и представить исправленную работу на повторную проверку непосредственно преподавателю. Исправления необходимо сделать в той же тетради.

7. Студент должен быть готов во время зачета или экзамена дать пояснения по существу решения задач, входящих в контрольные работы.

8. Решения задач следует сопровождать краткими, но исчерпывающими пояснениями; в тех случаях, когда это, возможно, сделать схематический чертеж или рисунок, поясняющий содержание задачи.

9. Решать задачу необходимо в общем, виде, т.е. выразить искомую величину в буквенных обозначениях величин, заданных в условии задач. При таком способе решения не производится вычисления промежуточных величин.

10. После получения сложной расчетной формулы для проверки правильности ее следует подставить в правую часть формулы вместо символов величин обозначения единиц этих величин, произвести с ним необходимые действия и убедится в том, что полученная при этом единица соответствует искомой величине. Если такого соответствия нет, то это означает, что задача решена неверно.

11. Числовые значения величин при подстановке их в расчетную формулу следует выражать только в единицах СИ. В виде исключения допускает выражать в любых, но одинаковых единицах числовые значения однородных величин, стоящих в числителе и знаменателе дроби и имеющие одинаковые степени.

12. При подстановке в расчетную формулу, а также при записи ответа числовые значения величин следует записывать как произведение десятичной дроби с одной значащей цифрой перед запятой на соответствующую степень десяти. Например, вместо 3520 надо записать $3,52 \cdot 10^3$, вместо 0,00129 записать $1,29 \cdot 10^{-3}$ и т. п.

13. Вычисления по расчетной формуле надо проводить с соблюдением правил приближенных вычислений. Как правило, окончательный ответ следует записывать с тремя значащими цифрами. Это относится к случаю, когда результат получен с применением калькулятора.

Задачи

101. Точка двигалась в течение $t_1 = 15\text{с}$ со скоростью $V_1 = 5\text{м/с}$, в течение $t_2 = 10\text{с}$ со скоростью $V_2 = 8\text{м/с}$, и в течение $t_3 = 6\text{с}$ со скоростью $V_3 = 20\text{ м/с}$. Определить среднюю путевую скорость точки.

102. Три четверти своего пути автомобиль прошел со скоростью $V_1 = 60\text{ км/ч}$, остальную часть – со скоростью $V_2 = 80\text{ км/ч}$. Какова средняя скорость автомобиля?

103. Первую половину пути тело двигалось со скоростью $V_1 = 2\text{ м/с}$, вторую – со скоростью $V_2 = 8\text{ м/с}$. Определите среднюю путевую скорость $\langle V \rangle$.

104. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью $V_1 = 16\text{ км/ч}$, вторую половину пути – со скоростью $V_2 = 12\text{ км/ч}$.

Определите среднюю скорость велосипедиста.

105. Тело падает с высоты $h = 100$ м с нулевой начальной скоростью. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, какой путь пройдет тело за последнюю секунду падения.

106. Зависимость пройденного телом пути от времени задаётся уравнением $s = A - Bt + Ct^2 + Dt^3$ ($A = 6$; $B = 3\text{м/с}$; $C = 2\text{м/с}^2$; $D = 1\text{м/с}^3$). Определите для тела в интервале времени от $t_1 = 1\text{с}$ до $t_2 = 4\text{с}$: 1) среднюю скорость; 2) среднее ускорение.

107. Поезд движется со скоростью $V_0 = 20$ км/ч. Если выключить ток, то поезд, двигаясь равнозамедленно, останавливается через время $t = 20\text{с}$. Каково ускорение a поезда? На каком расстоянии S надо выключить ток?

108. Свободно падающее тело в последнюю секунду движения проходит половину всего пути. С какой высоты падает h тело и каково время t его падения.

109. Движение материальной точки задано уравнением $x = At + Bt^2$, где $A = 4\text{м/с}$ $B = -0,05\text{м/с}^2$. Определить момент времени, в который скорость V точки равна нулю. Найти координату и ускорение в этот момент.

110. С балкона бросили мячик вертикально вверх с начальной скоростью $V_0 = 5\text{м/с}$. Через $t = 2\text{ с}$ мячик упал на землю. Определить высоту балкона над землей и скорость мячика в момент удара о землю.

111. Диск радиусом $r = 20$ см вращается согласно уравнению $\omega = t + 0,1t^3$. Определить тангенциальное a и нормальное a_n и полное a ускорения точек на окружности диска для момента времени $t = 10\text{с}$.

112. Маховик начал вращаться равноускоренно и за время $t = 10\text{с}$ достиг частоты вращения $n = 300\text{мин}^{-1}$. Определить угловое ускорение маховика и число N оборотов, которые он сделал за это время.

113. Якорь электродвигателя, имеющий частоту вращения $n = 50\text{с}^{-1}$, после выключения тока, сделав $N = 314$ оборотов, остановился. Определить угловое ускорение α якоря.

114. Линейная скорость V_1 , лежащих на окружности радиуса R вращающегося диска равна 3м/с . Точки, расположенные ближе к оси на $R = 10\text{см}$, имеют скорость $V_2 = 2\text{м/с}$. Определить частоту вращения n диска.

115. По дуге окружности радиусом $R = 10$ м движется точка. В некоторый момент времени нормальное ускорение $a_n = 4,9 \text{ м/с}^2$; в этот момент векторы полного и нормального ускорений образуют угол $\alpha = 60^\circ$. Найти скорость V и тангенциальное ускорение a точки.

116. Диск радиусом $r = 10$ см, находившийся в состоянии покоя, начал вращаться с постоянным угловым ускорением $0,5 \text{ рад/с}^2$. Найти тангенциальное a и нормальное a_n и полное a ускорения точек, лежащих на окружности диска, в конце второй секунды после начала движения.

117. На цилиндр, который может вращаться около горизонтальной оси, намотана нить. К концу нити привязали грузик и предоставили ему возможность опускаться. Двигаясь равноускоренно, грузик за время $t = 3\text{с}$ опустился на $h = 1,5\text{м}$. Определите угловое ускорение цилиндра, если его радиус $r = 4\text{см}$.

118. Тело брошено горизонтально со скоростью $V_0 = 15\text{м/с}$. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить радиус кривизны траектории тела через $t = 2\text{с}$ после начала движения.

119. Точка движется по кривой с постоянным тангенциальным ускорением $a = 0,5\text{м/с}^2$. Определить полное ускорение a точки на участке кривой с радиусом кривизны $R = 3\text{м}$, если точка движется на этом участке со скоростью $V = 2\text{м/с}$.

121. Для сжатия пружины на $x_1 = 1\text{ см}$ нужно приложить силу $F = 10\text{Н}$. Какую работу A нужно совершить, чтобы сжать пружину на $x_2 = 10\text{ см}$, если сила пропорциональна сжатию?

122. Определить во сколько раз сила притяжения на Земле больше силы притяжения на Марсе, если радиус Марса составляет $0,53$ радиуса Земли, а масса Марса – $0,11$ массы Земли.

123. Космическая ракета летит на Луну. В какой точке прямой, соединяющей центры масс Луны и Земли, ракета будет притягиваться Землей и Луной с одинаковой силой.

124. Радиус планеты равен 100 км , средняя плотность вещества планеты равна 3г/см^3 . Определить вторую космическую скорость V_2 у поверхности этой планеты.

125. Какую надо совершить работу A , чтобы пружину жесткостью $k = 800\text{ Н/м}$, сжатую на $x = 6\text{ см}$, дополнительно сжать на $x = 8\text{ см}$.

126. Определить жесткость k системы двух пружин при последовательном и параллельном их соединении. Жесткость пружин $k_1 = 2\text{ кН/м}$ и $k_2 = 6\text{ кН/м}$.

127. Определить высоту, на которой ускорение свободного падения составляет 25% от ускорения свободного падения на поверхности Земли.

128. Определить работу, которую совершают силы гравитационного поля Земли, если тело массой $m = 1\text{кг}$ упадет на поверхность Земли с высоты, равной радиусу Земли. Радиус Земли и ускорение свободного падения g на ее поверхности считать известным.

129. Две пружины жесткостью $k_1 = 0,3\text{кН/м}$ и $k_2 = 0,8\text{кН/м}$ соединены последовательно. Определить абсолютную деформацию x_1

первой пружины, если вторая деформирована на x_2 1,5см.

130. Определить работу растяжения двух соединенных последовательно пружин жесткостями k_1 400Н/м и k_2 250Н/м, если первая пружина растянулась при этом на x 2см.

131. При горизонтальном полете со скоростью V 250м/с снаряд массой m 8кг разорвался на две части. Одна часть массой m_1 6кг получила скорость V_1 400м/с в направлении полета снаряда. Определить скорость второй части снаряда.

132. Орудие, жестко скрепленное на платформе, производит выстрел вдоль полотна железной дороги под углом Γ 30° к линии горизонта. Определить скорость V_1 отката платформы, если снаряд вылетает со скоростью V_2 480м/с. Масса платформы с орудием и снарядами m_1 18т, масса снаряда m_2 60кг.

133. Снаряд, летевший со скоростью V 400м/с в верхней точке траектории разорвался на два осколка. Меньший осколок, масса которого составляет 40% от массы снаряда, полетел в противоположном направлении со скоростью V_1 150м/с. Определить скорость V_2 большего осколка.

134. На сколько переместится относительно берега лодка длиной l 3,5м и массой m_1 200кг, если стоящий на корме человек массой m_2 80кг переместится на нос лодки?

135. На полу стоит тележка в виде длинной доски, снабженная легкими колесами. На одном конце стоит человек. Масса его m_1 60кг, масса доски m_2 20кг. С какой скоростью (относительно пола) будет двигаться тележка, если человек пойдет вдоль нее со скоростью (относительно доски) V 1м/с.

136. Конькобежец, стоя на коньках на льду, бросает камень массой m_1 2,5кг под углом Γ 30° к горизонту со скоростью V_1 10м/с. Какова будет скорость V_2 движения конькобежца, если его масса m_2 60кг?

137. Шар массой m_1 10кг, движущийся со скоростью V_1 4м/с, сталкивается с шаром массой m_2 4кг, скорость V_2 которого равна 12 м/с. Считая удар прямым, неупругим, найти скорость и шаров после удара в двух случаях: 1) малый шар нагоняет большой шар, движущийся в том же направлении; 2) шары движутся навстречу друг другу.

138. Платформа с песком общей массой M 2т стоит на рельсах на горизонтальном участке пути. В песок попадает снаряд массой m 8кг и застревает в нем. Пренебрегая трением, определить, с какой скоростью будет двигаться платформа, если в момент попадания скорость снаряда V 450м/с, а ее направление – сверху вниз под углом Γ 30° к горизонту.

139. Человек массой m_1 70кг, бегущий со скоростью V_1 9км/ч, догоняет тележку массой m_2 190кг, движущийся со скоростью

V_2 3,6км/ч, и вскаивает на нее. С какой скоростью станет двигаться тележка с человеком. С какой скоростью станет двигаться тележка с человеком, если человек до прыжка бежал на встречу тележке.

140. Лодка длиной l 3м и массой m 120кг стоит спокойно на воде. На носу и корме находятся два рыбака массами m_1 60кг и m_2 90кг. На сколько сдвинется относительно воды, если рыбаки поменяются местами.

141. С какой наименьшей высоты h должен начать скатываться акробат на велосипеде (не работая ногами), чтобы проехать по дорожке, имеющей форму «мертвой петли» радиусом $R=4\text{м}$, и не оторваться от дорожки в верхней точке петли? Трением пренебречь.

142. Найти работу A подъема груза по наклонной плоскости длиной l 2м, если масса груза равна m 100кг, угол наклона 30° , коэффициент трения $f=0,1$ и груз движется с ускорением $a=1\text{м/с}^2$.

143. Ядро атома распадается на два осколка массами $m_1=1,6 \cdot 10^{-25}\text{ кг}$ и $m_2=2,4 \cdot 10^{-25}\text{ кг}$. Определить кинетическую энергию T_2 второго осколка, если кинетическая энергия T_1 первого осколка равна 18нДж.

144. При выстреле из орудия снаряд массой $m_1=10\text{кг}$ получает кинетическую энергию $T_1=1,8\text{МДж}$. Определить кинетическую энергию T_2 ствола орудия вследствие отдачи, если масса m_2 ствола орудия равна 600кг.

145. Конькобежец, стоя на льду, бросил вперед гирю массой $m_1=5\text{ кг}$ и вследствие отдачи откатился назад со скоростью $V_2=1\text{м/с}$. Определить работу A , совершенную конькобежцем при бросании гири, если его масса $m_2=60\text{кг}$.

146. Под действием силы $F=400\text{Н}$, направленной вертикально вверх, груз массой $m=20\text{кг}$ поднят на высоту $h=15\text{м}$. Какой потенциальной энергией P будет обладать поднятый груз? Какую работу A совершил сила F .

147. Камешек скользит с наивысшей точки купола, имеющего форму полусферы. Какую дугу Π опишет камешек, прежде чем оторвется от поверхности купола? Трением пренебречь.

148. Под действием постоянной силы F вагонетка прошла путь $s=5\text{м}$ и приобрела скорость $V=2\text{м/с}$. Определить работу A силы, если масса вагонетки равна 400 кг и коэффициент трения равен $f=0,01$.

149. Материальная точка массой $m=2\text{кг}$ двигалась под действием некоторой силы согласно уравнению $x=A+Bt+Ct^2+Dt^3$, где $A=10\text{м}$; $B=-2\text{м/с}$; $C=1\text{м/с}^2$, $D=-0,2\text{м/с}^3$. Найти мощность N , затрачиваемую на движение точки, в момент времени $t=2\text{с}$.

150. В баллистический маятник массой $M=5\text{кг}$ попала пуля массой $m=10\text{г}$ и застряла в нем. Найти скорость пули, если маятник, отклонившись после удара, поднялся на высоту $h=10\text{см}$.

151. По касательной к шкиву в виде диска диаметром $D=75\text{см}$ и

массой $m = 40\text{кг}$ приложена сила $F = 1\text{kH}$. Определить угловое ускорение Π и частоту вращения n маховика через время $t = 10\text{s}$ после начала действия силы, если радиус шкива r равен 12см .

152. Маховик в виде сплошного диска, момент инерции которого $J = 150\text{кг м}^2$, вращается с частотой $n = 240\text{об/мин}$. Через $t = 1\text{мин}$ после начала действия сил торможения он остановился. Определить момент M сил торможения и число оборотов от начала торможения до полной остановки.

153. К ободу колеса радиусом $R = 0,5\text{м}$ и массой $m = 50\text{кг}$ приложена касательная сила $F = 98,1\text{Н}$. Найти угловое ускорение Π колеса. Через какое время t после начала действия силы колесо будет иметь частоту вращения $n = 100\text{с}^{-1}$? Колесо считать однородным диском. Трением пренебречь.

154. На обод маховика диаметром $D = 75\text{см}$ намотан шнур, к концу которого привязан груз массой $m = 2\text{кг}$. Определить момент инерции J маховика, если он, вращаясь равноускоренно под действием силы тяжести груза, за время $t = 3\text{s}$ приобрел угловую скорость 9рад/с .

155. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом $R = 0,5\text{м}$ намотана легкая нить, к концу которой прикреплен груз массой $m = 5\text{кг}$. Груз, разматывая нить, опускается с ускорением $a = 1,96\text{м/с}^2$. Определить момент инерции вала.

156. Определить момент силы M , который необходимо приложить к блоку, вращающемуся с частотой $n = 12\text{с}^{-1}$, чтобы он остановился в течение времени $t = 8\text{s}$. Диаметр блока $D = 30\text{см}$. Массу блока $m = 6\text{кг}$ считать равномерно распределенной по ободу.

157. Нить с привязанными к ее концам грузами массами $m_1 = 50\text{г}$ и $m_2 = 60\text{г}$ перекинута через блок диаметром $D = 4\text{см}$. Определить момент инерции J блока, если под действием силы тяжести грузов он получил угловое ускорение $\Pi = 5\text{рад/с}^2$.

158. Стержень вращается вокруг оси, проходящей через его середину, согласно уравнению $\Pi = 2t + 0,2t^3$. Определить вращающий момент M , действующий на стержень через время $t = 2\text{s}$ после начала вращения, если момент инерции стержня $J = 0,048 \text{ кг м}^2$.

159. К ободу однородного сплошного диска радиусом $R = 0,5\text{м}$ приложена постоянная касательная сила $F = 200\text{Н}$. При вращении диска на него действует момент сил трения $M = 2\text{Н м}$. Определить массу диска, если известно, что его угловое ускорение Π постоянно и равно 14рад/с^2 .

160. На барабан радиусом $R = 50\text{см}$ намотан шнур, к концу которого привязан груз массой $m = 10\text{кг}$. Найти момент инерции J барабана, если известно, что груз опускается с ускорением $a = 2,04\text{м/с}^2$.

161. На краю платформы в виде диска, вращающегося по инерции вокруг вертикальной оси с частотой $n_1 = 8\text{мин}^{-1}$, стоит человек

массой m_1 70кг. Когда человек перешел в центр платформы, она стала вращаться с частотой n_2 10мин⁻¹. Определить массу m_2 платформы. Момент инерции человека рассчитывать как для материальной точки.

162. Горизонтальная платформа массой m 25кг и радиусом R 80см вращается с частотой n_1 9мин⁻¹. В центре платформы стоит человек и держит в расставленных руках гири. Считая платформу диском, определить частоту вращения платформы, если человек, опустив руки, уменьшит свой момент инерции от J_1 3,5кг м² до J_2 1кг м².

163. На краю неподвижной платформы могущей вращаться вокруг вертикальной оси стоит человек массой m_1 60кг. Диаметр платформы D 0,8м, масса m_1 6кг. С какой угловой скоростью Π начнет вращатьсяся платформа, если человек поймет летящий на него мяч массой m 0,5кг? Траектория мяча горизонтальна и проходит на расстоянии r 0,4м от оси платформы. Скорость мяча V 5м/с.

164. Человек, стоящий на скамье Жуковского, держит в руках стержень длиной l 2,5м и массой m 8кг, расположенный вертикально вдоль оси вращения скамейки. Эта система (скамья и человек) обладает моментом инерции J 10кг м² и вращается с частотой n_1 12мин⁻¹. Определите частоту n_2 вращения систем, если стержень повернут в горизонтальное положение.

165. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, может вращаться по инерции вокруг неподвижной вертикальной оси. На краю платформы стоит человек, масса которого в 3 раза меньше массы платформы. Определите, как и во сколько раз изменится угловая скорость вращения платформы, если человек перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы.

166. Маховик в виде диска массой m 80кг и радиусом R 30см находится в состоянии покоя. Какую работу A_1 нужно совершить маховику частоту n 10с⁻¹. Какую работу A_2 пришлось бы совершить, если бы при той же массе диск имел меньшую толщину, но вдвое больший радиус.

167. Колесо радиусом R 30см и массой m 3кг скатывается без трения по наклонной плоскости длиной l 5 м и углом наклона 25°. Определить момент инерции колеса, если его скорость v в конце движения составляла 4,6м/с.

168. Платформа в виде диска радиусом R 1,5м и массой m_1 180кг вращается по инерции около вертикальной оси с частотой n_1 10мин⁻¹. в центре платформы стоит человек массой m_2 60кг. Какую линейную скорость относительно пола помещения будет иметь человек, если он перейдет на край платформы?

169. Горизонтальная платформа массой m_1 150кг вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через центр платформы, с

частотой $n = 8 \text{ мин}^{-1}$. Человек массой $m_2 = 70 \text{ кг}$ стоит при этом на краю платформы. С какой угловой скоростью начнет вращаться платформа, если человек прейдет от края платформы к ее центру? Считать платформу круглым однородным диском, а человека – материальной точкой.

170. Стержень длиной $l = 1,5 \text{ м}$ и массой $m = 10 \text{ кг}$ может вращаться вокруг неподвижной оси, проходящей через верхний конец стержня. В середину стержня ударяет пуля массой $m_0 = 10 \text{ г}$, летящая в горизонтальном направлении со скоростью $V_0 = 500 \text{ м/с}$, и застревает в стержне. На какой угол отклонится стержень после удара?

171. Шарик массой $m = 60 \text{ г}$ колеблется с периодом $T = 2 \text{ с}$. В начальный момент времени смещение шарика $x_0 = 4,0 \text{ см}$ и он обладает энергией $E = 0,02 \text{ Дж}$. Записать уравнение простого гармонического колебания шарика и закон изменения возвращающей силы с течением времени.

172. Складываются два колебания одинакового направления и одинакового периода: $x_1 = A_1 \sin \omega_1 t$ и $x_2 = A_2 \sin \omega_2(t+\tau)$, где $A_1 = A_2 = 3 \text{ см}$, $\omega_1 = \omega_2 = \pi \text{ с}^{-1}$, $\tau = 0,5 \text{ с}$. Определить амплитуду A и начальную фазу ϕ_0 результирующего колебания. Написать его уравнение. Построить векторную диаграмму для момента времени $t = 0,1$.

173. Точка участвует одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, уравнения которых $x = A_1 \sin \omega_1 t$ и $y = A_2 \cos \omega_2 t$, где $A_1 = 8 \text{ см}$, $A_2 = 4 \text{ см}$, $\omega_1 = \omega_2 = 2 \text{ с}^{-1}$. Написать уравнение траектории и построить ее. Показать направление движения точки.

174. Определить период T колебаний математического маятника, если его модуль максимального перемещения $\Delta r = 18 \text{ см}$, и максимальная скорость $v_{\max} = 16 \text{ см/с}$.

175. Определить частоту v простых гармонических колебаний диска радиусом $R = 20 \text{ см}$ около горизонтальной оси, проходящей через середину радиуса диска перпендикулярно его плоскости.

176. На гладком горизонтальном столе лежит шар массой $M = 200 \text{ г}$, прикрепленный к горизонтально расположенной легкой пружине с жесткостью $k = 500 \text{ Н/м}$. В шар попадает пуля массой $m = 10 \text{ г}$, летящая со скоростью $v = 300 \text{ м/с}$, и застревает в нем. Пренебрегая перемещением шара во время удара и сопротивлением воздуха, определить амплитуду A и период T колебаний шара.

177. Определить период T простых гармонических колебаний диска радиусом $R = 40 \text{ см}$ около горизонтальной оси, проходящей через образующую диска.

178. Точка совершает простые гармонические колебания, уравнение которых $x = A \sin \omega t$, где $A = 5 \text{ см}$, $\omega = 2 \text{ с}^{-1}$. В момент времени, когда точка обладала потенциальной энергией $P = 0,1 \text{ мДж}$, на нее действовала возвращающая сила $F = 5 \text{ мН}$. Найти этот момент времени t .

179. Материальная точка совершает простые гармонические колебания так, что в начальный момент времени смещение $x_0 = 4$ см, а скорость $v_0 = 10$ см/с. Определить амплитуду A и начальную фазу ϕ_0 колебаний, если их период $T=2$ с.

180. На стержне длиной $l=30$ см укреплены два одинаковых грузика: один – в середине стержня, другой – на одном из его концов. Стержень с грузами колеблется около горизонтальной оси, проходящей через свободный конец стержня. Определить приведенную длину L и период T простых гармонических колебаний данного физического маятника. Массой стержня пренебречь.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задачи

201. Определить количества Π вещества и число молекул N кислорода массой $m = 0,5$ кг.

202. Сколько атомов содержится в ртути массой $m = 1$ г и количеством вещества $\Pi = 0,2$ моль.

203. Найти молярную массу M и массу m_0 одной молекулы поваренной соли.

204. Определить массу m_0 одной молекулы углекислого газа.

205. В баллоне $V = 3$ л содержится кислород массой $m = 10$ г. Определить концентрацию молекул газа.

206. Определить количества вещества Π и число молекул N азота массой $m = 0,2$ кг.

207. Определить молярную массу M и массу m_0 одной молекулы азота и окиси азота NO .

208. Определить концентрацию n молекул кислорода, находящегося в сосуде вместимостью $V = 2$ л. Количество вещества Π кислорода равно 0,2 моль.

209. Определить количества вещества Π водорода, заполняющего сосуд объемом $V = 3$ л, если концентрация молекул газа в сосуде $n = 2 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-3}$.

210. Сколько атомов содержат газы массой $m = 1$ г каждый: 1) гелий; 2) углерод.

211. Определить внутреннюю энергию U водорода, а также среднюю кинетическую энергию $\langle \Pi_k \rangle$ молекулы этого газа при температуре $T = 300\text{K}$, если количество вещества Π этого газа равно 0,5 моль.

212. Определить суммарную кинетическую энергию E_k поступательного движения всех молекул газа находящегося в сосуде вместимостью $V = 3$ л под давлением $p = 100$ кПа.

213. Количество вещества гелия $\Pi = 1,5$ моль, температура

$T = 120\text{K}$. Определить суммарную кинетическую энергию E_k поступательного движения всех молекул этого газа.

214. Молярная внутренняя энергия U_m некоторого двухатомного газа равна $6,02\text{kДж/моль}$. Определить кинетическую энергию $\langle \Pi_{\text{вр}} \rangle$ вращательного движения одной молекулы этого газа. Газ считать идеальным.

215. Определить среднюю кинетическую энергию $\langle \bar{\epsilon} \rangle$ одной молекулы водяного пара при температуре $T = 500\text{K}$.

216. Определить среднюю квадратичную скорость $\langle v^2 \rangle$ молекулы газа, заключенного в сосуд вместимостью $V = 2\text{l}$ под давлением

$p = 200\text{kPa}$. Масса газа $m = 0,3\text{g}$.

217. Водород находится при температуре $T = 300\text{K}$. Найти среднюю кинетическую энергию $\langle \bar{\epsilon}_{\text{вр}} \rangle$ вращательного движения одной молекулы, а также этого газа суммарную кинетическую энергию E_k всех молекул этого газа; количество вещества водорода $0,5\text{моль}$.

218. При какой температуре средняя кинетическая энергия $\langle \bar{\epsilon}_{\text{пост}} \rangle$ поступательного движения молекулы газа равна $4,14 \cdot 10^{-21}\text{ Дж}$?

219. В азоте взвешены мельчайшие пылинки, которые движутся так, как если бы они были очень крупными молекулами. Масса каждой пылинки равна $6 \cdot 10^{-10}\text{g}$. Газ находится при температуре $T = 400\text{K}$. Определить средние квадратичные скорости $\langle \bar{v}_{\text{кв}}^2 \rangle$, а также средние кинетические энергии $\langle \Pi_{\text{пост}} \rangle$ поступательного движения азота и пылинки.

220. Определить среднюю кинетическую энергию $\langle \Pi_{\text{пост}} \rangle$ поступательного движения и $\langle \Pi_{\text{вр}} \rangle$ вращательного движения молекулы

азота при температуре $T = 300\text{K}$. Определить также полную кинетическую энергию E_k молекулы при тех же условиях.

221. Каким должен быть наименьший объем V баллона вмещающего массу $m = 6,4\text{kg}$ кислорода, если его стенки при температуре $t = 20^\circ\text{C}$ выдерживают давление $p = 15,7\text{МПа}$.

222. В баллоне находилось масса $m = 10\text{ kg}$ газа при давлении $p_1 = 10\text{МПа}$. Какую массу Δm газа взяли из баллона, если давление стало равным $p_2 = 2,5\text{МПа}$? Температуру газа считать постоянной.

223. Найти m воздуха, заполняющего аудиторию высотой $h = 5\text{m}$ и площадью пола $S = 200\text{м}^2$. Давление воздуха $p = 100\text{kPa}$. Температура помещения $t = 17^\circ\text{C}$. Молярная масса воздуха $M = 0,029\text{kg/моль}$.

224. Какое количества v газа находится в болоне $V = 10\text{м}^3$ при давлении $p = 96\text{kPa}$ и температуре $t = 17^\circ\text{C}$?

225. В баллоне вместимостью 15 л находится азот под давлением 100 kPa при температуре $t_1 = 27^\circ\text{C}$. После такого как из баллона выпустили азот массой 14g , температура газа стало равной $t_2 = 17^\circ\text{C}$. Определите давление азота, оставшегося в баллоне.

226. В сосуде вместимостью V 0,3л при температуре t 290К находится некоторый газ. На сколько понизится давление газа в сосуде, если из него из-за утечки выйдет N 10^{19} молекул?

227. Давление воздуха внутри плотно закупоренной бутылки t_1 70С было p_1 100кПа. При нагревании бутылки пробка вылетела. До какой температуры t_2 нагрели бутылку, если известно, что пробка вылетела при давлении воздуха в бутылке p_2 130кПа?

228. Масса m 12г газа занимает объем V 4л при температуре t_1 70С. После нагревания газа при постоянном давлении его плотность стало равной 0,6кг/м³. До какой температуры t_2 нагрели газ?

229. Баллон V 12л содержит углекислый газ. Давление p газа равно 1МПа, температура T 300К. Определить массу m газа в баллоне.

230. Газ при температуре T 309К давление p 0,7МПа имеет плотность 12кг/м³. Определить относительную молекулярную массу M_r газа.

231. В сосуде 1 объемом V 3л находится газ под давлением p_1 0,2МПа. В сосуде 2 объемом V 4л находится то же газ под давлением p_2 0,1МПа. Температуры газа в обоих сосудах одинаковы. Под каким давлением p будет находиться газ, если соединить сосуды с трубкой.

232. Баллон вместимостью V 20л содержит смесь водорода и азота при температуре 290К и давлении 1МПа. Определите массу водорода, если масса смеси равна 150г.

233. В закрытом сосуде вместимостью 20л находится водород массой 6г и гелий массой 12г. Определите: 1) давление; 2) молярную массу газовой смеси в сосуде, если температура смеси T 300К.

234. Один баллон объемом V 10л содержит кислород под давлением p_1 1,5МПа, другой баллон объемом V 22л содержит азот под давлением p_2 0,6МПа. Когда баллоны соединили между собой, оба газа смешались, образовав однородную смесь (без изменения температуры). Найти парциальные давления p_1 и p_2 обоих газов в смеси и полное давление p смеси.

235. Смесь водорода и азота общей массой m 290г при температуре $T=600$ К и давлении p 2,46МПа занимает объем V 30л. Определить массу m_1 водорода и массу m_2 азота.

236. В баллонах объем V_1 20л и V_2 44л содержится газ. Давление в первом баллоне p_1 2,4МПа, во втором – p_2 1,6МПа. Определить общее давление p и парциальные p_1 и p_2 после соединение баллонов, если температура газа осталась прежней.

237. В сосуде с объемом V 0,01м³ содержится смесь газов – азота массой m_1 7 г и водорода массой m_2 1г – при температуре $T=280$ К. Определить давление p смеси газов.

238. В сосуде объемом $V = 2\text{л}$ находится масса $m_1 = 6\text{г}$ углекислого газа (CO_2) и масса m_2 закиси азота (N_2O) при температуре $t = 127^\circ\text{C}$. Найти давление p смеси в сосуде.

239. В сосуде находятся масса $m_1 = 14\text{г}$ азота и масса $m_2 = 9\text{г}$ водорода при температуре $t = 10^\circ\text{C}$ и давлении $p = 1\text{МПа}$. Найти молярную массу M смеси и объем V сосуда.

240. В сосуде находится масса $m_1 = 10\text{г}$ углекислого газа и масса $m_2 = 15\text{г}$ азота. Найти плотность ρ смеси при температуре $t = 27^\circ\text{C}$ и давлении $p = 150\text{Па}$.

241. Найти среднюю длину свободного хода пробега $\langle l \rangle$ молекул воздуха при нормальных условиях. Диаметр молекул воздуха \square

$$\square 0,3\text{нм}.$$

242. Баллон вместимостью $V = 10\text{л}$ содержит водород массой $m = 1\text{г}$. Определить среднюю длину свободного хода пробега $\langle l \rangle$ молекулы.

243. Определить плотность ρ разреженного водорода, если средняя длина свободного пробега $\langle l \rangle$ молекул равна 1 см.

244. Какова средняя арифметическая скорость $\langle v \rangle$ молекул кислорода при нормальных условиях; если известно, что среднее значение свободного пробега $\langle l \rangle$ молекулы кислорода при этих условиях равно 100 нм.

245. Найти среднюю длину свободного хода пробега $\langle l \rangle$ молекул азота в сосуде объемом $V = 5\text{л}$. Масса газа $m = \square 0,5\text{кг}$.

246. Определить среднюю продолжительность $\langle t \rangle$ свободного пробега молекул воздуха при температуре $t = 27^\circ\text{C}$ и давлении $p = 0,5\text{кПа}$. Диаметр молекул водорода принять равным 0,28 нм.

247. Найти среднюю длину свободного пробега $\langle l \rangle$ молекул углекислого газа при температуре $t = 100^\circ\text{C}$ и давлением $p = 13,3\text{Па}$. Диаметр молекул углекислого газа $\square \square 0,32\text{нм}$.

248. Найти среднюю длину свободного пробега $\langle l \rangle$ молекул водорода при давлении $p = 0,1\text{Па}$ и температуре $T = 100\text{К}$.

249. Найти среднюю продолжительность $\langle \tau \rangle$ свободного пробега молекул кислорода при температуре $T = 250\text{К}$ и давление $p = 100\text{Па}$.

250. Найти среднее число столкновений $\langle z \rangle$ в единицу времени молекул углекислого газа при температуре $t = 100^\circ\text{C}$, если средняя длина свободного пробега 870мкм .

251. Определить количество теплоты Q , которые надо сообщить кислороду объемом $V = 50\text{л}$ при его изохорном нагревании, чтобы давление газа повысилось на $\Delta p = 0,5\text{МПа}$?

252. При изотермическом расширении азота при температуре $T = 280\text{К}$ объем его увеличился в два раза. Определить: 1) совершенную при расширении газа работу A ; 2) изменение ΔU внутренней энергии; 3)

количество теплоты Q , полученное газом. Масса азота $m = 0,2\text{ кг}$.

253. Кислород массой $m = 200\text{ г}$ занимает объем $V_1 = 100\text{ л}$ и находится под давлением $p_1 = 200\text{ кПа}$. При нагревании газ расширяется при постоянном давлении до объема $V_2 = 300\text{ л}$, а затем его давление возросло до $p_2 = 500\text{ кПа}$ при неизменном объеме. Найти изменения внутренней энергии ΔU газа, совершенную газом работу A и теплоту Q , переданную газу. Построить график процесса.

254. Объем водорода при изотермическом расширении ($T = 300\text{ К}$) увеличился в $n = 3$ раза. Определить работу A , совершенную газом, и теплоту Q , полученную при этом. Масса m водорода равна 200 г .

255. Азот массой $m = 0,1\text{ кг}$ был изобарно нагрет от температуры $T_1 = 200\text{ К}$ до температуры $T_2 = 400\text{ К}$. Определить работу A , совершенную газом, полученную им теплоту Q и изменения ΔU внутренней энергии азота.

256. Во сколько раз увеличился объем водорода, содержащий количество вещества $v = 0,4\text{ моль}$ при изотермическом расширении, если при этом газ получит количество теплоты $Q = 800\text{ Дж}$. Температура водорода $T = 300\text{ К}$.

257. Какая работа A совершается при изотермическом расширении водорода массой $m = 5\text{ г}$, взятого при температуре $T = 290\text{ К}$, если объем газа увеличился в 3 раза?

258. Какая доля W_1 – количество теплоты Q , проводимого к идеальному двухатомному газу при изобарном процессе, расходуется на увеличение ΔU внутренней энергии газа и какая доля W_2 – на работу A расширения?

259. Определить работу A , которую совершает азот, если ему при постоянном давлении сообщить количество теплоты $Q = 21\text{ кДж}$. Найти также изменение ΔU внутренней энергии газа.

260. Масса $m = 10\text{ г}$ кислорода находится при давлении $p = 300\text{ кПа}$ и температуре $t = 10^\circ\text{C}$. После нагревания при $p = \text{const}$ газ занял объем $V = 10\text{ л}$. Найти количество теплоты Q , полученное газом, изменение ΔU внутренней энергии газа и работу A , совершенную газом при расширении.

261. В результате кругового процесса газ совершил работу $A = 1\text{ Дж}$ и передал охладителю количество теплоты $Q_2 = 4,2\text{ Дж}$. Определить к.п.д. η цикла.

262. Совершая замкнутый процесс, газ получил от нагревателя количество теплоты $Q = 4\text{ кДж}$. Определить работу A газа при протекании цикла, если его термический к.п.д. $\eta = 1$.

263. Идеальный газ совершил цикл Карно, $2/3$ количества теплоты Q_1 , полученного из нагревателя, отдает охладителю. Температура T_2 охладителя равна 280 К . Определить температуру T_1 нагревателя.

264. Идеальный газ совершил цикл Карно. Температура T_1 нагревателя в четыре раза выше температуры охладителя. Какую долю w количества теплоты, полученного за один цикл от нагревателя, газ отдает охладителю?

265. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, за цикл получает от нагревателя количество теплоты Q_1 2,512 кДж. Температура нагревателя T_1 400К, температура холодильника T_2 300К. Найти работу A , совершенную машиной за один цикл и количество теплоты Q_2 , отдаваемое холодильнику за один цикл.

266. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно. При этом 80% количества теплоты, получаемое от нагревателя, передается холодильнику. Машина получает от нагревателя количество теплоты $Q_1=6,28$ кДж. Найти к.п.д. η цикла и работу A , совершающую за один цикл.

267. В цикле Карно газ получил от нагревателя теплоту Q_1 500 Дж и совершил работу A 100 Дж. Температура нагревателя T_1 400К. Определить температуру охладителя

268. Газ, совершающий цикл Карно, получает теплоту Q_1 84 кДж. Определить работу A газа, если температура T_1 теплоотдатчика в три раза выше температуры T_2 теплоприемника.

269. Во сколько раз увеличится к.п.д. цикла Карно при повышении температуры теплоотдатчика от T_1 380К до T_1 560К. Температура теплоприемника T_2 280К.

270. Определить работу A_2 изотермического сжатия газа, совершающего цикл Карно, к.п.д. которого 0,4, если работа изотермического расширения A_1 8 Дж.

271. Какую работу A надо совершить, чтобы, выдувая мыльный пузырь, увеличить его диаметр от d_1 1 см до d_2 11 см? Считать процесс изотермическим.

272. Воздушный пузырек диаметром d 2 мкм находится в воде у самой ее поверхности. Определить плотность воздуха в пузырьке, если воздух над поверхностью воды находится при нормальных условиях.

273. На сколько давление p воздуха внутри мыльного пузыря больше атмосферного давления p_0 , если диаметр мыльного пузыря d 5 мм?

274. Глицерин поднялся в капиллярной трубке на высоту h 20 мм. Определить поверхностное натяжение σ глицерина, если диаметр d канала трубки равен 1 мм.

275. Вода по каплям вытекает из вертикальной трубы внутренним радиусом r 1 мм. Найти радиус R капли в момент отрыва. Каплю считать сферической. Диаметр шейки капли в момент отрыва

считать равным внутреннему диаметру трубы.

276. На сколько нагреется капля ртути, полученная от слияния двух капель $r = 1\text{мм}$ каждая?

277. Какую работу против сил поверхностного натяжения надо совершить, чтобы выдуть мыльный пузырь диаметром $d = 4\text{см}$? Поверхностное натяжение мыльного пузыря $0,043\text{Н/м}$.

278. В сосуд с ртутью опущен открытый капилляр, внутренний диаметр которого $d = 3\text{мм}$. Разность уровней ртути в сосуде и в капилляре $h = 3,7\text{мм}$. Найти радиус кривизны R мениска в капилляре.

279. На какую высоту поднимается бензол в капилляре, внутренний диаметр которого $d = 1\text{мм}$? Смачивание считать полным.

280. Капилляр, внутренний радиус которого $r = 0,5\text{мм}$, опущен в жидкость. Определить массу жидкости, поднявшейся в капилляре, если его поверхностное натяжение равно 60мН/м .

5. Критерии оценки расчетно-графической работы и типовые ошибки при ее выполнении.

Критерии оценки расчетно-графической работы:

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в том случае, если все задачи решены, к задачам приведены пояснения;
- оценка «не зачтено» ставится в том случае, если какая-либо задача отсутствует или приведены недостаточные пояснения к решению задачи.

При выполнении расчетно-графической работы по физике часто встречаются следующие ошибки:

1. Не соблюденны правила оформления расчетно-графической работы.
2. Не выдержанна структура расчетно-графической работы (отсутствует библиографический список, теоретическая часть к задаче и т. д.).
3. Не указаны единицы измерения полученных результатов.
4. В задаче отсутствуют выводы или содержимое выводов к задаче неконструктивны.
5. Отсутствие готовности обучающегося отвечать на теоретические вопросы, являющиеся основой для решения задачи.
6. Задание на расчетно-графическую работу выполнено не по своему варианту.

6. Рекомендуемая литература

Основная литература

Механика, молекулярная физика и основы термодинамики : учебное пособие для выполнения лабораторных работ / В. А. Андреев [и др.] ; под ред. В. В. Самарина. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2010.

Оптика и квантовая физика : учебное пособие для выполнения лабораторных работ / В. А. Андреев [и др.] ; под ред. С. М. Казакова. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2010.

Самарин, В. В. Атомная и ядерная физика : учеб. пособие для выполнения лабораторных работ / В. В. Самарин. - Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2012.

Трофимова, Т. И. Курс физики [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. И. Трофимова. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 559 с.

Демидченко В. И. Физика [Электронный ресурс] : учебник / В.И. Демидченко, И.В. Демидченко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 581 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/bookread2.php?book=469821>

Дополнительная литература

Чертов, А. Г. Задачник по физике : учебное пособие / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1988.

Трофимова, Т. И. Сборник задач по курсу физики с решениями : учебное пособие для вузов / Т. И. Трофимова, З. Г. Павлова. - 7-е изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2006.

Хавруняк В. Г. Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим доступа : <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=375844>

Периодика

Наука и Жизнь[Электронный ресурс] :научно-популярный журнал / гл. ред. Лозовская Е.Л. – М.: Наука и жизнь, 2018. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=430673

Вестник БГУ. Серия 1. Физика. Математика. Информатика [Электронный ресурс] :научно-теоретический журнал / Белорусский государственный

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для написания РГР

1. Профессиональная база данных и информационно-справочные системы	Информация о праве собственности (реквизиты договора)
Ассоциация инженерного образования России http://www.ac-raee.ru/	Совершенствование образования и инженерной деятельности во всех их проявлениях, относящихся к учебному, научному и технологическому направлениям, включая процессы преподавания, консультирования, исследования, разработки инженерных решений, включая нефтегазовую отрасль, трансфера технологий, оказания широкого спектра образовательных услуг, обеспечения связей с общественностью, производством, наукой и интеграции в международное научно-образовательное пространство. свободный доступ
научная электронная библиотека Elibrary http://elibrary.ru/	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе свободный доступ
Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru	Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки. Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий, информационные материалы для широкого круга читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи. Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Кафедра Информационных технологий, электроэнергетики и систем управления

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА по дисциплине «ФИЗИКА»

Наименование темы

Выполнил: студент __ курса
заочного отделения
по направлению _____

Ф.И.О.

Научный руководитель:

должность, звание

Ф.И.О.

Оценка _____

Дата «__» _____ 2022г.

Чебоксары 2022

1. ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Таблица 1

Основные физические постоянные (округленные значения)

Нормальное ускорение свободного падения	g	9,81 м/с ²
Гравитационная постоянная	G	$6,67 \cdot 10^{-11} \text{ м}^2 \cdot (\text{кг} \cdot \text{с})^{-2}$
Постоянная Авогадро	N_A	$6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$
Молярная газовая постоянная	R	8,31 Дж/(моль · К)
Стандартный объем*	V_m	$22,4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{моль}$
Постоянная Больцмана	k	$1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$

* Молярный объем идеального газа при нормальных условиях.

Таблица 2

Некоторые астрономические величины

Наименование	Числовое значение
Радиус Земли	$6,37 \cdot 10^6 \text{ м}$
Масса Земли	$5,98 \cdot 10^{24} \text{ кг}$
Средняя плотность Земли	$5,52 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$
Радиус Солнца	$6,95 \cdot 10^8 \text{ м}$
Масса Солнца	$1,98 \cdot 10^{30} \text{ кг}$
Средняя плотность Солнца	$1,41 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$
Радиус Луны	$1,74 \cdot 10^6 \text{ м}$
Масса Луны	$7,33 \cdot 10^{22} \text{ кг}$
Расстояние от центра Земли до центра Солнца	$1,49 \cdot 10^{11} \text{ м}$
Расстояние от центра Земли до центра Луны	$3,84 \cdot 10^8 \text{ м}$
Период обращения Луны вокруг Земли	27,3 сут. $\approx 2,36 \cdot 10^6 \text{ с}$

Таблица 3

Плотность твердых тел

Твердое тело	Плотность, кг/м ³	Твердое тело	Плотность, кг/м ³
Алюминий	$2,70 \cdot 10^3$	Медь	$8,93 \cdot 10^3$
Барий	$3,50 \cdot 10^3$	Никель	$8,90 \cdot 10^3$
Ванадий	$6,02 \cdot 10^3$	Свинец	$11,3 \cdot 10^3$
Висмут	$9,80 \cdot 10^3$	Серебро	$10,5 \cdot 10^3$
Железо	$7,88 \cdot 10^3$	Цезий	$1,90 \cdot 10^3$
Литий	$0,53 \cdot 10^3$	Цинк	$7,15 \cdot 10^3$

Таблица 4

Плотность жидкостей

Жидкость	Плотность, кг/м ³	Жидкость	Плотность, кг/м ³
Бензол	$0,88 \cdot 10^3$	Керосин	$0,80 \cdot 10^3$
Вода	$1,00 \cdot 10^3$	Ртуть	$13,6 \cdot 10^3$
Глицерин	$1,26 \cdot 10^3$	Сероуглерод	$1,26 \cdot 10^3$
Касторовое масло	$0,90 \cdot 10^3$	Спирт	$0,80 \cdot 10^3$

Таблица 5

Плотность газов (при нормальных условиях)

Газ	Плотность, кг/м ³	Газ	Плотность, кг/м ³
Азот	1,25	Воздух	1,29

Аргон	1,78	Гелий	0,18
Водород	0,09	Кислород	1,43

Таблица 6

Коэффициент поверхностного натяжения

Жидкость	Коэффициент, мН/м	Жидкость	Коэффициент, мН/м
Бензол	30	Мыльная пленка	40
Вода	72	Ртуть	500
Глицерин	62	Спирт	22

Таблица 7

Эффективный диаметр молекулы

Газ	Диаметр, нм	Газ	Диаметр, нм
Азот	0,30	Воздух	0,27
Аргон	0,35	Гелий	0,19
Водород	0,23	Кислород	0,27

Таблица 8

**Относительные атомные массы (округленные значения) Ar
элементов периодической системы**

Элемент	Символ	Ar	Элемент	Символ	Ar
Азот	N	14	Марганец	Mn	55
Алюминий	Al	27	Медь	Cu	64
Аргон	Ar	40	Молибден	Mo	96
Барий	Ba	137	Натрий	Na	23
Ванадий	V	60	Неон	Ne	20
Водород	H	1	Никель	Ni	59
Вольфрам	W	184	Олово	Sn	119
Гелий	He	4	Платина	Pt	195
Железо	Fe	56	Ртуть	Hg	201
Золото	Au	197	Сера	S	32
Калий	K	39	Серебро	Ag	108
Кальций	Ca	40	Углерод	C	12
Кислород	O	16	Уран	U	238
Магний	Mg	24	Хлор	Cl	35

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры, протокол № 6 от «04» марта 2023 г.

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз данных и информационных справочных системах, актуализации тем для самостоятельной работы, актуализации вопросов для подготовки к промежуточной аттестации, актуализации перечня основной и дополнительной учебной литературы.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 202__-202__ учебном году на заседании кафедры, протокол № от «___» 202__ г.

Внесены дополнения и изменения _____

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 202__-202__ учебном году на заседании кафедры, протокол № от «___» 202__ г.

Внесены дополнения и изменения _____

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 202__-202__ учебном году на заседании кафедры, протокол № от «___» 202__ г.

Внесены дополнения и изменения _____
